

# **Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 616\*01**

Point B. Quels sont les spécimens concernés par l'opération?

Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description
B1 Grand Capricorne <i>Cerambyx cerdo</i>	Non quantifiable	Destruction directe d'individus
B2 Crapaud épineux <i>Bufo spinosus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction directe d'individus reproducteurs, destruction de pontes ou de larves.
B3 Rainette méridionale <i>Hyla meridionalis</i>	Estimation de 10 à 50 individus	Destruction directe d'individus reproducteurs, destruction de pontes ou de larves.
B4 Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>	Estimation 10 à 20 individus	Destruction directe d'individus
B5 Lézard à deux raies <i>Lacerta b. bilineata</i>	Estimation 5 à 20 individus	Destruction directe d'individus
B6 Couleuvre de Montpellier <i>Malpolon monspessulanus</i>	Estimation de 1 à 5 individus	Destruction directe d'individus
B7 Couleuvre vipérine <i>Natrix maura</i>	Estimation de 10 à 30 individus	Destruction directe d'individus
B8 Couleuvre à collier helvétique <i>Natrix helvetica</i>	Estimation 5 à 10 individus	Destruction directe d'individus
B9 Barbastelle d'Europe* <i>Barbastella barbastellus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B10 Campagnol amphibie <i>Arvicola sapidus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B11 Noctule de Leisler <i>Nyctalus Leisleri</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B12 Pipistrelle pygmée <i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B13 Pipistrelle de Nathusius <i>Pipistrellus nathusii</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B14 Pipistrelle commune <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B15 Oreillard roux <i>Plecotus auritus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B16 Murin de Daubenton <i>Myotis daubentonii</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B17 Ecureuil roux <i>Sciurus vulgaris</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B18 Hérisson d'Europe* <i>Erinaceus europaeus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B19 Grand/petit Murin <i>Myotis myotis/blythii</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B20 Murin à oreilles échanquées <i>Myotis emarginatus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B21 Grand noctule <i>Nyctalus osiopterus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus

B22 Noctule commune <i>Nyctalus noctula</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B23 Groupe des « Murins de Naterrer » <i>Myotis naterreri/crypticus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B24 Oreillard gris <i>Plecotus austriacus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B25 Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B26 Murin de Capaccini* <i>Myotis capaccini</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B27 Grand Rhinolophe * <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B28 Petit Rhinolophe * <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B29 Sérotine commune <i>Eptesicus serotinus</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B30 Pipistrelle de Kuhl <i>Pipistrellus kuhli</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus
B31 Muscardin * <i>Muscardinus avellanarius</i>	Estimation de 1 à 10 individus	Destruction potentielle d'individus

\* Espèces potentielles